



Frelon asiatique : le mémo du jardinier

Le reconnaître, repérer un nid et réagir sans danger,
saison par saison

GUIDE PRATIQUE JARDIN BLEU

Frelon asiatique : le mémo du jardinier

Le reconnaître, repérer un nid et réagir sans danger, saison par saison

Au sommaire

- 01 L'essentiel
- 02 Le reconnaître
- 03 Le cycle de la colonie
- 04 Où chercher
- 05 Face à un nid
- 06 Se protéger au jardin
- 07 Le piégeage
- 08 Calendrier de vigilance
- 09 Fiche d'observation
- 10 Fiche : contacts utiles
- 11 Check-list : printemps au jardin
- 12 Sources

Édité par PRODIF pour Jardin Bleu (jardinbleu80.fr). Rédaction : La rédaction Jardin Bleu. Version du 12 octobre 2026. Ce guide donne des repères généraux : vérifiez toujours les notices des fabricants, les règles locales et les conditions de votre terrain. Usage personnel ; reproduction et revente interdites.

CHAPITRE 01

L'essentiel

Le frelon asiatique (*Vespa velutina*) est arrivé en France au milieu des années 2000 et s'est répandu sur une grande partie du territoire. Il chasse les abeilles et ses nids, parfois cachés dans une haie ou sous un abri, peuvent provoquer des piqûres multiples quand on les dérange sans les voir.

La règle d'or : on ne détruit jamais un nid soi-même. On s'éloigne, on signale, on fait intervenir un professionnel.

CHAPITRE 02

Le reconnaître

Critère	Frelon asiatique	Frelon européen
Couleur générale	Très sombre, presque noir	Brun-roux et jaune
Abdomen	Une seule large bande orangée vers l'extrémité	Largement jaune rayé de noir
Pattes	Jaunes à l'extrémité	Brunes
Taille	Un peu plus petit que le frelon européen	Plus grand
Nid	Nid primaire bas au printemps, nid secondaire souvent haut en été	Souvent dans des cavités

Les guêpes sont plus petites, nettement jaunes et noires, et leurs nids sont souvent dans le sol ou dans des cavités.

CHAPITRE 03

Le cycle de la colonie

1. **Fin d'hiver – printemps** : les reines fondatrices sortent d'hivernage et construisent seules un **nid primaire**, de la taille d'une orange à celle d'un petit ballon, souvent bas et abrité : sous un toit d'abri, un auvent, dans une haie, un composteur.
2. **Début d'été** : la colonie grandit et migre souvent vers un **nid secondaire** beaucoup plus gros, généralement haut dans un arbre.
3. **Fin d'été – automne** : le nid atteint sa taille maximale et produit les futures reines.
4. **Hiver** : la colonie meurt ; seules les futures reines hivernent à l'abri. Le nid vide n'est pas réutilisé.

CHAPITRE 04

Où chercher

- Sous les avancées de toit des abris de jardin, cabanons et garages
- Sous les auvents et pergolas couvertes
- Dans les haies, surtout avant une taille
- Dans les composteurs, les nichoirs, les tas de bois
- En hauteur dans les arbres, en été

Un va-et-vient régulier de frelons dans une même direction trahit souvent la présence d'un nid.

CHAPITRE 05

Face à un nid

1. **Éloignez-vous calmement**, sans gestes brusques, et ne restez pas devant l'entrée.
2. **Ne tentez jamais de le détruire** : ni jet d'eau, ni bâton, ni feu, ni bombe insecticide.
3. **Éloignez les enfants et les animaux**, balisez la zone si possible.
4. **Notez l'emplacement**, la hauteur et la taille approximative du nid.
5. **Signalez-le** selon le dispositif en place chez vous : mairie, département ou plateforme dédiée selon les territoires.
6. **Faites intervenir un professionnel** pour la destruction.

En automne ou en hiver, un nid sans activité est vide : sa destruction n'a plus d'intérêt. Il peut simplement être signalé pour le suivi local.

CHAPITRE 06

Se protéger au jardin

- Inspectez les abris et les haies avant de tailler ou de bricoler, surtout au printemps.
- Ne taillez pas une haie à l'aveugle en été si vous avez observé des allées et venues.
- Une piqûre de frelon est douloureuse. En cas de piqûres multiples, de piqûre dans la bouche ou la gorge, ou de signes de malaise ou d'allergie, appelez immédiatement le 15 ou le 112.

CHAPITRE 07

Le piégeage

Les pièges non sélectifs capturent de nombreux autres insectes, dont des pollinisateurs. Si vous envisagez un piégeage, renseignez-vous sur les recommandations locales et sur les modèles sélectifs, et limitez-le aux périodes et aux lieux préconisés, par exemple à proximité de ruchers.

CHAPITRE 08

Calendrier de vigilance

Période	Ce qui se passe	Vos réflexes
Février – avril	Sortie des fondatrices, nids primaires	Inspecter abris, auvents, haies basses
Mai – juin	Nids primaires en croissance, premiers nids secondaires	Vérifier avant toute taille, signaler rapidement
Juillet – septembre	Nids secondaires actifs, chasse aux abeilles	Prudence en taillant les haies, observer les allées et venues
Octobre – novembre	Production des futures reines	Repérer les nids à la chute des feuilles
Décembre – janvier	Colonies mortes, reines en hivernage	Signaler les nids vides découverts, sans intervenir

À REMPLIR / À COCHER

Fiche d'observation

Date	Lieu exact	Hauteur	Taille du nid	Activité	Signalé à	Suite donnée

À REMPLIR / À COCHER

Fiche : contacts utiles

Dispositif de signalement de ma commune ou de mon département

Professionnel de la désinsectisation

Apiculteur voisin

- Urgences : 15 ou 112

À REMPLIR / À COCHER

Check-list : printemps au jardin

- ☐ Dessous de toit de l'abri inspecté
- ☐ Auvents et pergolas vérifiés
- ☐ Composteurs et nichoirs contrôlés
- ☐ Haie observée avant la taille
- ☐ Dispositif de signalement local identifié

RÉFÉRENCES

Sources

Muséum national d'Histoire naturelle — Inventaire national du patrimoine naturel, fiche

Vespa velutina

<https://inpn.mnhn.fr>

Office français de la biodiversité

<https://www.ofb.gouv.fr>

ANSES — santé des abeilles

<https://www.anses.fr>